

CODI ICTUS PEDIÀTRIC A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA

QUAN CAL ACTIVAR EL CODI ICTUS PEDIÀTRIC?

Infant amb focalitat neurològica sobtada

 Temps d'evolució < 8 hores

Cal sospitar ictus en presència
d'UN o MÉS d'aquests signes i símptomes

- Dèficit motor/sensitiu d'un membre o més d'un
- Paràlisi facial central
- Trastorn del llenguatge (parlar, entendre)
- Alteració de la visió (pèrdua de la visió d'un ull o hemicamp) o diplopia
- Alteració cerebel·losa
- Crisis epilèptiques repetides o paràlisi de Todd > 60 min (en infants amb epilèpsia cal valorar si les crisis són diferents de les habituals)
- Moviments anormals d'un hemicòs
- Cefalea invalidant amb rigidesa del clatell o sense
- Coma de causa no aclarida

COM S'ACTIVA EL CODI ICTUS PEDIÀTRIC?



Telefonau al 061 (Servei d'Atenció Mèdica Urgent) si presenta un o més dels signes i símptomes de la llista

El 061 farà una telefonada a tres amb el pediatre hospitalari referent de cada illa:



Pediatre d'Urgències de l'Hospital Universitari Son Espases




Pediatre de guàrdia de l'Hospital Mateu Orfila




Pediatre de guàrdia de l'Hospital Can Misses

Els infants que presenten algun criteri de la llista de signes i símptomes però no compleixen criteris d'activació del codi ictus pel temps d'evolució s'han de valorar de manera urgent igualment

RÀPID / ICTUS PEDIÀTRIC



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I SERVEI SALUT
B ILLES BALEARS



Quines dades mínimes cal aportar per activar el codi ictus?

Nom, edat i comorbiditats


Signes i/o símptomes detectats

Temps d'evolució, escala de Glasgow, constants vitals

QUINES ACCIONS CAL DUR A TERME ABANS DE TRASLLADAR EL PACIENT A UN CENTRE HOSPITALARI?

Avaluació del pacient:

- Triangle d'avaluació pediàtrica (TEP)
- ABC
- Escala de Glasgow
- Escala PedNIHSS (vegeu el vídeo, accessible amb el codi QR)



Estabilització:

- Controlau la temperatura: si és superior a 37,5 °C, administreu paracetamol
- Manteniu la normoglucèmia, la normovolèmia i la normooxygenació (Sat O₂ > 95 %)
- Controlau la pressió arterial: manteniu-la dins els límits normals (percentil 50-90)
- Canalitzeu una via endovenosa (al braç no parètic) si és possible
- Dieta absoluta
- Posició de decúbit supí amb el cap alçat 30°
- Si presenta convulsions, tractau-les de la manera habitual (benzodiazepines)

**El diagnòstic precoç
de l'ictus isquèmic millora
el pronòstic del pacient**



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I SERVEI SALUT
B ILLES BALEARS

CÓDIGO ICTUS PEDIÁTRICO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

¿CUÁNDO HAY QUE ACTIVAR EL CÓDIGO ICTUS PEDIÁTRICO?

Niño con focalidad neurológica súbita



Tiempo de evolución < 8 horas

Hay que sospechar ictus en presencia de UNO o MÁS de estos signos y síntomas

- Déficit motor/sensitivo de un miembro o más de uno
- Parálisis facial central
- Trastorno del lenguaje (hablar, entender)
- Alteración de la visión (pérdida de la visión de un ojo o hemisferio) o diplopia
- Alteración cerebelosa
- Crisis epilépticas repetidas o parálisis de Todd > 60 min (en niños con epilepsia hay que valorar si las crisis son diferentes a las habituales)
- Movimientos anormales de un hemisferio
- Cefalea invalidante con o sin rigidez de la nuca
- Coma de causa no aclarada

¿CÓMO SE ACTIVA EL CÓDIGO ICTUS PEDIÁTRICO?



Llame al 061 (Servicio de Atención Médica Urgente) si presenta uno o más de los signos y síntomas de la lista

El 061 hará una llamada a tres con el pediatra hospitalario referente de cada isla:



Pediatra de Urgencias del Hospital Universitario Son Espases



Pediatra de guardia del Hospital Mateu Orfila



Pediatra de guardia del Hospital Can Misses

Los niños que presentan algún criterio de la lista de signos y síntomas pero no cumplen criterios de activación del código ictus por el tiempo de evolución deben ser valorados de forma urgente igualmente

RÀPID / ICTUS PEDIÀTRIC



R IURE
Intentau fer-lo riure: veureu que torça la boca



A LÇAR
els braços
Demanau-li que alci els braços: veureu que un no el pot alçar o que li costa



P ARLAR
Veureu que li costa parlar o que no l'enteneu

G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I SERVEI SALUT
B ILLES BALEARS



I CTUS?
L'ictus es presenta de manera sobtada



D E PRESSA!
Si l'infant té alterada alguna d'aquestes capacitats, telefonau urgentment al 061

¿Qué datos mínimos hay que aportar para activar el código ictus?

Nombre, edad y comorbilidades


Signos y/o síntomas detectados

Tiempos de evolución, escala de Glasgow, constantes vitales

¿QUÉ ACCIONES HAY QUE LLEVAR A CABO ANTES DE TRASLADAR AL PACIENTE A UN CENTRO HOSPITALARIO?

Evaluación del paciente:

- Triángulo de evaluación pediátrica (TEP)
- ABC
- Escala de Glasgow
- Escala PedNIHSS (véase el vídeo, accesible con el código QR)



Estabilización:

- Controle la temperatura: si es superior a 37,5 °C, administre paracetamol
- Mantenga la normoglucemia, la normovolemia y la normooxigenación (Sat O₂ > 95 %)
- Controle la presión arterial: manténgala dentro de los límites normales (percentil 50-90)
- Canalice una vía endovenosa (en el brazo no parético) si es posible
- Dieta absoluta
- Posición de decúbito supino con la cabeza levantada 30°
- Si presenta convulsiones, trátelas del modo habitual (benzodiacepinas)

El diagnóstico precoz del ictus isquémico mejora el pronóstico del paciente



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I SERVEI SALUT
B ILLES BALEARS