MANEIG I TRACTAMENT DEL PEU DIABÈTIC EN INFERMERIA

Melcior Lladó Vidal - Unitat de Peu Diabètic
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca

Coneixem els nostres peus?

- Estructura anatòmica molt complexa i especialitzada:
 - Suport del cos
 - Absorbir pes i força
 - Propulsió
 - Òrgan receptor d'estímuls.
- La seva forma i funcionament depenen de factors genètics i ambientals.

¿Qué es el pie diabético?

“Es la ulceración, infección y/o gangrena del pie asociadas a neuropatía diabética y a diferentes grados de enfermedad arterial, como resultado de la interacción de diferentes factores metabólicos” (O.M.S.)

“Presencia de signos, síntomas o úlcera en el pie, a causa de las complicaciones crónicas de la diabetes” (Viadé 2010)

- El 70% del total de amputaciones en extremidades inferiores se practican en pacientes diabéticos.
- Un 5% de los pacientes diabéticos tienen úlcera, y consumen cerca del 15% de todos los recursos sanitarios.
- Entre el 7 y el 20% de los pacientes con úlcera en el pie sufrirá finalmente una amputación.
- La mortalidad a 5 años tras una amputación mayor es del 70%.

MANEJO Y TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO EN ENFERMERÍA

¿Que es una unidad de pie diabético?

“Unidad asistencial de ámbito hospitalario dependiente del servicio de Endocrinología” (Viadé, 2010)

- Recursos humanos básicos: endocrinólogos, enfermera educadora y podólogo con formación específica en pie diabético.
- Vínculos asistenciales con otras especialidades implicadas.

¿ Cual debe ser el objetivo común?

¿Qué hacer ante una úlcera?

DIAGNÓSTICO

CRIBAJE NEUROISQUÉMICO:

Evaluación sensibilidades

Pulsos:

Si

No

Estudio angiográfico (ACV)

INFECCIÓN

Diagnóstico de Osteomielitis

- Test contacto óseo
- Exploración a través de imagen

Cultivo microbiológico

ESTUDIO BIOMECÁNICO: ¿factor causal?

TRATAMIENTO

ATB: sistémicos

CIRUGÍA:

Legrado/ resección
Osteotomias (TRA)
ATP/By-pass (ACV)

DESCARGA: tipos

CURA TÓPICA

Control médico Endocrinológico
Educación diabetológica

¿Qué hacer ante una úlcera?

NEUROPÁTICA:

NEUROISQUÉMICA:

Exploración sensibilidades: barestésica, palestésica y dolorosa

Exploración vascular: Pulsos: pedia, tibial posterior, poplitea.

Índice tobillo-brazo (ITB):

Valores de referencia:

ITB < 0.9 = EAP

ITB < 0.6 = IC

ITB 0.9-1.2 = normal

ITB > 1.2 = no fiable

Contrastar: localización, dolor, clínica de claudicación intermitente, FRCV

Clasificación del riesgo y frecuencia de inspección recomendada

Riesgo (clasificación)	Características	Frecuencia de inspección
Bajo riesgo	Sensibilidad conservada, pulsos palpables	Anual
Riesgo aumentado	Neuropatía, ausencia de pulsos u otro factor de riesgo	Cada 3-6 meses
Alto riesgo	Neuropatía o pulsos ausentes junto a deformidad o cambios en la piel Úlcera previa	Cada 1-3 meses
Pie ulcerado		Tratamiento individualizado, posible derivación

GRAU D'INFECCIÓ (PEDIS, 2003)

- **INFECCIÓ LLEU:**
 - 1) Absència de signes sistèmics
 - 2) Celulitis perilesional < 2cm

- **INFECCIÓ MODERADA/SEVERA:**
 - 1) Celulitis perilesional > 2cm
 - 2) Exudació/supuració abundant.
 - 3) Trajectes (exposició òssia)
 - 4) Signes sistèmics.
 - 5) Canvis anòmals en l'analítica.

Diagnóstico de infección

Cultivo Microbiológico

Técnicas de imagen

Un 10-20% de lesiones leves y un 50-60% de graves se complican con osteomielitis.

¿OSTEOMIELITIS?

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

- 1) TEST DE CONTACTO ÓSEO
- 2) Historia de úlceras (r/n)
- 3) NO reducción área > 50% 4-6 sem
- 4) Superficie > 2 cm²
- 5) VSG/PCR
- 6) RX

ERRORES más comunes

Considerar que

- El tratamiento de las úlceras no infectadas resolverán mas precozmente el problema
- Hay que tratar las ulceras infectadas hasta su completa curación (cierre)
- El tratamiento antibiótico deberá dirigirse siempre al microorganismo aislado
- Deben tratarse todos los microorganismos aislados en las muestra recogidas
- El tratamiento antibiótico i.v es aconsejable en la mayoría de pacientes con IPD

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA CLÍNICA

RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA MUESTRA PARA EL CULTIVO

- ✓ Condiciones de asépsia
- ✓ Limpiar y desbridar el área antes de cultivar
- ✓ Muestra profunda mediante biopsia (bisturí o “punch”) del tejido o hueso (sospecha de osteítis o osteomielitis)
- ✓ Aspiración de secreciones purulentas mediante aguja y jeringa estériles)
- ✓ Transporte y procesamiento rápidos (aerobios y anerobios)

Tratamiento antibiótico

Dosis vía oral:

Amoxi/clav 875/125 mg/ 8 h

Clinda 300/6 h

Ciprofloxacino 500mg/12 h

Metronidazol 500/8h

Levo 500-750/24h

Cotrimoxazol 400 mg, 2 o 3 dosis/día

Linezolid 500/12h

Moxifloxacino 400/24 h

Dosis vía endovenosa:

Ertapenem: 1g/24h

Imipenem 0'5/6h

Meropenem 1 g/8h

Piperacilina/tazobactam: 0'5-4mg/8h

Vancomicina 1g/12 h

Daptomicina 6-8 mg/Kg/dia

Tratamiento antibiótico

Guía orientativa de tratamiento empírico:

Infección leve:

Amoxicilina/clav. 875/125 mg/8h

Infección moderada o alergia a penicilina:

Ciprofloxacino 500 mg/12 h + clindamicina 300 mg/8h
Levo 500-750/24h

Infección grave:

Levofloxacino 500mg/12h + clindamicina 600 mg/8h
Metronidazol 500mg/6h
Imipenem 0'5g/6h o meropenem 1g/8h

Sospecha MARSA:

Vancomicina 1g/12h
Imipenem + daptomicina 6-8 mg/Kg/dia

PRODUCTOS DE APLICACIÓN TÓPICA DE UTILIDAD EN ÚLCERAS EN EL PIE DIABÉTICO

Desbridantes

Películas de poliuretano

Hidrocoloide en apósito

Hidrogeles

Alginatos

Hidrocoloide en fibra

Espumas (Foam)

Apósitos antimicrobianos

Descontaminantes

Presión negativa

Otros

✓ Espumas hidropoliméricas

✓ Espumas hidrocapilares

✓ Apósitos con plata

✓ Apósitos de carbón

MANEJO Y TRATAMIENTO DEL PE DIABÉTICO EN ENFERMERÍA

¿Como reducir la presión en la úlcera?

➔ $P=f/s$

Tipos de descargas

- Provisionales: con úlcera
- Definitivas: úlcera cicatrizada. Prevención

Descargas: plastic cast

MANEJO Y TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO EN ENFERMERÍA

MANEJO Y TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO EN ENFERMERÍA

MANEJO Y TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO EN ENFERMERÍA

INCIDIR EN LOS FACTORES ASOCIADOS: EDUCACIÓN

HISTORIA DE ÚLCERA/AMPUTACIÓ	
NEUROPATIA	Sensitivo-motora/autonòmica
TRAUMÀTICA	Calçat inadequat * Caminar descalç* Caigudes Objectes dins calçat *
BIOMECÀNICA	Limitació articular i/o dèficit visual * Prominències òssies * Deformitats * Hiperqueratòsis * Osteoartropatia *
ARTERIOPATÍA PERIFÈRICA	
CONDICIÓ SOCIOECONÒMICA	Incompliment normes *

Algoritmo de Evaluación y tratamiento del Pie Diabético (ROVI) 2012

Grado ulcera	I	II	III	IV
Localización	Epidermis	Dermis	Tendón/Hueso SIN isquemia	Destrucción ósea, tejidos y/o isquemia
Gravedad Infección Nivel de Asistencia	SIN infección Atención primaria	Infección superficial Atención primaria /UPD	Profunda /localizada UPD/Hospital	Grave o sistémica Hospital
Evaluación	Cribado Diagnostico OM Cultivo exudado?	Cribado Diagnostico OM Biopsia ? Punch ?	Cribado Diagnostico OM Biopsia ósea / Punch	Valorar estado general Cribado Diagnostico OM Biopsia ósea / Punch
Tratamiento	Fieltros < 0,5 cm / ortesis Cura tópica Repasar educación	Fieltros 1 cm / ortesis Antibióticos orales Cura tópica Repasar educación	Reposo parcial /Ingreso? Fieltros > 1 cm Plastic cast Antibióticos Cura tópica Desbridamiento, cirugía Repasar educación	Ingreso Hospital Descarga (andar) Antibióticos oral o IV Cura tópica Desbridamiento, cirugía Repasar educación

1.- Criterios de derivación:

a.- Criterios de derivación a la Unidad de Pie Diabético, servicio de Endocrinología

- Pacientes con úlcera en el pie (pie diabético) de origen neuropático.
- Cualquier tipo de úlcera con signos de infección grave tributaria de desbridamiento urgente.
- Sospecha de artropatia de Charcot.

b.- Criterios de derivación al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular

- Pacientes con úlcera y ITB < 0.7, pulsos distales no palpables, o claudicación intermitente a menos de 100 m.

2.- Prioridad

URGENTE

- Mal perforante plantar o úlcera con afectación sistémica
- Dolor isquémico de reposo (isquemia crítica) → S. Urgencias del HUSE

PREFERENTE

- Mal perforante plantar profundo o úlcera, sin afectación sistémica, con signos de celulitis o osteítis.
- Sospecha de pie de Charcot: pie caliente y/o con edema (casi siempre afectación unilateral).
- Úlcera superficial persistente (más de 1 mes) con tratamiento adecuado, o si existe sospecha de osteítis/osteomielitis.