


EL PAPALLÓ O CUCA DEL BOIX



Cydalima perspectalis

ESPÈCIE
INTRODÛIDA


Quan néixen mesuren 1 - 2 mm

Passen per 5 - 7 estadis larvaris

Arriben als 44 mm



Mascle



Femella

Detall part ventral de l'abdomen

CRISSÀLIDE



15 - 20 mm

Primer és verda, tornant-se marró, mostrant la banda fosca de les ales en el darrer estadi

ORIGEN I INTRODUCCIONS

És originària d'Àsia Oriental (Japó, Xina, Taiwan, Corea...)


Introduïda accidentalment mitjançant plantes ornamentals, especialment el boix de jardí.

S'ha extès a tota Europa: Alemanya (any 2007), Regne Unit, Suïssa, França (any 2008), Àustria (any 2009), Bèlgica, Hongria, Romania (any 2011)...

Es detecta a la Península Ibèrica (Pontevedra, any 2014) i a Balears (Mallorca, any 2018).

Actualment és present a Mallorca, Menorca, Formentera i Cabrera.

CICLE ANUAL Posta Eruga jove Eruga en creixement Eruga madura Crissàlide Adult



DANYS QUE PRODUEIX

L'espècie de planta **més afectada** per la presència de la cuca és el **boix autòcton (Buxus balearica)** tot i que també s'alimenta d'altres espècies de plantes.

Produeix la **defoliació** dels boixos per **menjar-se primer les fulles** i després les branques.

Actualment, suposa el principal factor d'amenaça de les comunitats de boixedes a l'illa de Mallorca.

CIÈNCIA CIUTADANA

Si trobes una cuca del boix, pots usar l'APP de Biodibal per a registrar la teva observació. Igualment, la pots fer servir per a documentar qualsevol espècie que trobis interessant.



Descarrega l'APP de Biodibal



QR Android



QR Apple iOS



Fes una foto



Puja-la



Consulta la seva observació

També pots col·laborar amb el projecte Biodibal visitant l'Appweb on podràs enregistrar i consultar observacions de qualsevol espècie de les Illes Balears.

