



La píldora del día siguiente

¿Qué es?

Es un fármaco para prevenir un embarazo no deseado.

¿Cuándo hay que tomarla?

En los días inmediatamente posteriores a un coito sin protección o cuando ha fallado o se ha usado de forma incorrecta el método anticonceptivo.


También sirve para evitar la concepción en los casos de relaciones sexuales forzadas.

¿Debe tomarse lo antes posible?




Sí. Es más efectiva si se toma antes de que hayan pasado 72 horas desde la relación sexual; más tarde, el efecto disminuye.

¿Es una bomba hormonal?



NO. Contiene la dosis mínima para retrasar la ovulación.

¿Es totalmente efectiva?



NO. Si no tienes la regla en 3 semanas, hazte una prueba de embarazo. Si vomitas en las 3 h después de haber tomado la píldora, vuelve a tomarla y utiliza un método de barrera hasta el ciclo siguiente.


¿Tiene efectos secundarios?



Son poco frecuentes y leves.


Los más comunes son náuseas, dolor abdominal, fatiga, dolor de cabeza, mareos y vómitos.

¿Puede alterar la regla siguiente?




Sí. Puede retrasarla.

¿Es abortiva?




No. Solo retrasa la ovulación y espesa el moco cervical para que los espermatozoides no lleguen a encontrar el óvulo. Si ya se ha producido el embarazo, no provoca el aborto.

¿Puede tomarse más de una vez?



Sí. Pero no debe plantearse como si fuese un método anticonceptivo habitual, ya que no actúa de forma continua (es decir, no sirve para relaciones sexuales posteriores).

¿Es gratis?



En los centros de salud se dispensa gratis, habiendo consultado antes con un profesional sanitario. En las farmacias hay que pagarla.

El único método anticonceptivo que **previene** de un **embarazo** y de una **infección de transmisión sexual** es el **preservativo**

