

VARICEL·LA

Definició de cas

Criteri clínic	<ul style="list-style-type: none">– <i>Rash</i> o exantema maculovesicular de començament sobtat, en absència d'una altra causa aparent.
Criteri de laboratori	<p>Almenys un dels quatre següents:</p> <ul style="list-style-type: none">– Detecció de l'ADN del VVZ mitjançant reacció en cadena de la polimerasa (PCR)*.– Aïllament del virus VVZ en cultius de línies cel·lulars.– Detecció d'antigen viral per immunofluorescència directa (IFD), utilitzant anticossos monoclonals específics.– Seroconversió o increment significatiu d'anticossos IgG (d'almenys 3 vegades) entre dos sèrums presos en fase aguda i en fase convalescent. <p><small>*Les mostres clíniques d'elecció per a l'assaig de PCR són les mostres d'exsudat de la lesió (líquid vesicular o cèl·lules preses de la base de la lesió). Quan hi hagi sospita d'afectació del sistema nerviós també s'han d'incloure mostres de LCR.</small></p>
Criteri epidemiològic	<ul style="list-style-type: none">– Vincle epidemiològic amb un cas confirmat de varicel·la entre 10 i 21 dies abans de l'inici de <i>rash</i> o exantema.

Classificació dels casos

- **Cas sospitós:** persona que compleix el criteri clínic.
- **Cas probable:** persona que compleix els criteris clínic i epidemiològic.
- **Cas confirmat:** persona que compleix el criteri clínic i de laboratori.