

Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
Paludisme	Ghana	Turiste Estranger	1
Paludisme	Costa de Marfil	Visita a Familiars	1
Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)			
Malaltia / Etiologia	Territori / Àmbit		Nre. casos
Covid-19	Palma / Residència Geriàtrica		29
Covid-19	Ciutadella / Residència Geriàtrica		5
Tuberculosi	Palma / Social		2
Salmonel·la / GEA	Palma / Alimentari		14
Novetats a www.epidemiologia.caib.es :			

SVMDO 2022 Brots de transmissió alimentària. Illes Balears. Dades definitives.

(Nota: La investigació de la majoria de brots alimentaris es realitza en coordinació i amb la col·laboració –entre d’altres- de la Xarxa Sanitària Pública i Privada, Laboratoris Clínics de microbiologia, Servei de Seguretat Alimentària i Laboratori de Salut Pública).

L’any 2022 s’han detectat 9 brots alimentaris (2 més que el 2021). 8 brots corresponen a Mallorca i 1 a Eivissa. El total d’afectats en els brots del 2022 ha estat de 67 i s’han verificat 10 ingressos hospitalaris. Per a la investigació dels brots s’han realitzat un total de 61 enquestes epidemiològiques individualitzades a afectats o concurrents.

El perfil epidemiològic dels brots de l’any 2022 mostra que 8 són de tipus col·lectiu i 1 de tipus familiar. Tots s’associaren al consum d’aliment, no identificat a 7 brots i carn o embotits a 2. No se va detectar cap brot d’origen hídric. Tots els brots eren d’etiologia infecciosa amb confirmació d’agent a 7: 6 per Salmonel·la i 1 campylobacter. Respecte dels factors contribuents – que poden haver contribuït a la generació del brots - es va detectar l’aplicació inadequada de temperatures a l’emmagatzemament o tractament de l’aliment, així com contaminacions creuades, manca d’higiene d’utensilis i locals i preparació de gran quantitat d’aliment amb desproporció de servei vs capacitat.

A la taula següent es detallen els notificador i altres variables d’aquests brots.

Brots alimentaris a les Illes Balears, 2022. Variables bàsiques (NA: Nombre d'afectats)					
Font d'informació	Municipi	Àmbit	NA	Vehicle	Agent identificat
Afectats	Eivissa	bar-restaurant	7	Desconegut	Cap
Clínica Juaneda (M. Interna)	Palma	bar-restaurant	6	Desconegut	Salmonel.la
H. Son Espases (M. Preventiva)	Palma	bar-restaurant	2	Desconegut	Salmonel.la
Altres	Palma	bar-restaurant	2	Desconegut	Salmonel.la
Seguretat Alimentària	Palma	Familiar	3	Desconegut	Salmonel.la
Centre Nacional d'Epidemiologia	Llucmajor	campament	2	Desconegut	Campylobacter
H. Inca (M. Interna)	Palma	bar-restaurant	2	Desconegut	Salmonel.la
CS Xaloc-Campos	Porreres	menjars preparats	41	carn i embotits	Cap
Afectats	Sineu	bar-restaurant	2	carn i embotits	Salmonel.la

En els anys 1988-2022 s’han acumulat un total de 883 brots i el màxim de brots en un any va ser el 1992 i 1994 amb 51 brots en els dos anys. El màxim a Mallorca varen ser 42 brots l’any 1992. El màxim per Menorca va ser d’11 brots el 1991 i per les Pitiüses de 8 el 1994. La mediana del quinquenni 2017-2021 és de 15 brots. En els darrers anys s’han detectat entre 3 i 22 brots anuals: Un total de 56 brots en el període 2018-2022.

A les figures següents es mostra la tendència global a la baixa -per illes i total de Balears- de l’evolució del nombre anual de brots des de l’any 1988 i el perfil evolutiu dels brots familiars i col·lectius.

A partir d'incidències altes a finals dels anys 80 i principis dels 90 - amb alguns anys amb més de 50 brots- la tendència baixa clarament en els període 2005-2012, any a partir del es dibuixa un perfil d'ona que acaba el 2000 amb un mínim històric de 3 brots. Aquest perfil evolutiu està marcat pels brots col·lectius que son la majoria.

Del total de 883 brots detectats des de l'any 1988, 682 (77%) són de tipus col·lectiu i 193 (22%) són d'àmbit familiar mentre la resta corresponen a àmbits poblacionals.

La majoria de brots acumulats (794; 90%) s'associaren la consum d'aliments i només 38 (4%) al consum d'aigua. A la resta no es va poder verificar el vehicle d'exposició. Igualment la majoria de brots són d'etiologia infecciosa (810; 92%) i només 51 (6%) d'etiologia tòxica. A la resta no es va poder aclarir l'etiologia.

A més de la meitat dels brots d'origen infeccios es va identificar salmonel·la i a un 40 % no es va poder verificar l'agent.

Selecció de figures:



